1843. HOFFMEISTER. *Arch. Naturgesch.*, IX, 1.
1889. MICHAELSEN. — *Abh. Nat. Ver. Hamburg*, XI.
1900. ID. — *Oligochæta*, Das Tierreich, X.
1771. MÜLLER (O.-F.). — Von Würmern ....
1774. ID. — *Vermium terrestrium* ....
1844. OERSTED. — *De Regionibus marinis.*
1888. ROULE (L.). — *C. R. Ac. Sci. Paris.*
1889. ID. — *Ann. Sci. Nat., Zool.* (7), VII.
1885. SAINT-LOUP (R.). — *C. R. Ac. Sci. Paris.*
1911. STEPHENSON (J.). — *Tr. R. Soc. Edinburgh.* XLVIII.
1914. WELCH (Paul S.). — *Bull. Illinois State Labor. Nat. Hist.*. X, III.
1917. ID. — *Tr. Amer. microsc. Soc.*, XXXVI, 3.
1919. ID. — *Rep. Canadian arctic Expedition*, IX, A.

POISSONS DE L'OUHAM ET DE L'OUBANGHI RECUEILLIS PAR M. BAUDON DESCRIPTION DE DEUX CYPRINIDÉS NOUVEAUX

PAR

LE Dr JACQUES PELLEGRIN

M. BAUDON administrateur des colonies a adressé l'année dernière au Muséum une très importante collection de Poissons du Gribingui (Haut-Chari) ne comprenant pas moins de 69 espèces, dont 7 nouvelles qui ont été décrites dans ce *Bulletin* (1).

Le second envoi étudié ici est loin d'être aussi considérable ; il n'en présente pas moins un certain intérêt, étant composé de petites formes et de jeunes d'espèces plus volumineuses. Il provient, en outre, de deux bassins différents, celui du Tchad et celui du Congo. Douze espèces, en effet, ont été récoltées en octobre 1919, au moment des hautes eaux à Sabo dans l'Ouham, affluent de la rive gauche du Chari ; parmi celles-ci, une du genre *Labeo* est nouvelle, ce qui porte à **102** le nombre des formes actuellement connues du bassin du Tchad. Trente-deux autres espèces ont été capturées en septembre et en décembre 1919, en période de hautes et moyennes eaux, à Bangui, dans l'Oubanghi, le plus gros affluent de la rive droite

(1) Dr J. PELLEGRIN. Poissons du Gribingui recueillis par M. Baudon. Description de sept espèces nouvelles (*Bull. Soc. Zool. France*, 1919, p. 201).

du Congo. Plusieurs de ces dernières sont intéressantes comme ayant été tout récemment décrites par MM. BOULENGER (1) et NICHOLS et GRISCOM (2). Enfin, une variété du *Barbus Baudoni* Blgr. jusqu'ici seulement signalée dans le Chari me paraît devoir être considérée comme nouvelle.

Poissons de Sabo (bassin du Tchad)

CHARACINIDÆ :	1. *Hydrocyon Forskåli* Cuvier.
—	2. *Alestes baremose* Joannis.
—	3. — *nurse* Ruppell.
—	4. — *macrolepidotus* C. V.
—	5. *Micralestes acutidens* Peters.
—	6. *Distichodus rostratus* Günther.
—	7. *Citharinus latus* M. T.
—	8. — *distichodoides* Pellegrin.
CYPRINIDÆ :	9. ***Labeo uhamensis*** nov. sp.
SILURIDÆ :	10. *Auchenoglanis occidentalis* C. V. var. *tchadiensis* Pellegrin.
CICHLIDÆ :	11. *Hemichromis bimaculatus* Gill.
—	12. *Tilapia galilæa* Artédi.

Poissons de Bangui (bassin du Congo)

MORMYRIDÆ :	1. *Mormyrops deliciosus* Leach.
—	2. *Petrocephalus Sauvagei* Boulenger.
—	3. — *Houllevillei* Blgr.
—	4. — *grandoculis* Blgr.
—	5. *Gnathonemus Greshoffi* Schilthuis.
CLUPEIDÆ :	6. *Pellonula tenuis* Nichols et Griscom.
—	7. — *(Pœcilothrissa) congica* Regan.
—	8. *Microthrissa Royauxi* Blgr.
CHARACINIDÆ :	9. *Alestes Imberi* Peters.
—	10. — *macrolepidotus* C. V.
—	11. *Micralestes acutidens* Peters.
—	12. *Nannæthiops tritæniatus* Blgr.
—	13. *Distichodus maculatus* Blgr.

(1) G. A. BOULENGER. Poissons recueillis au Congo belge par l'expédition du Dr Christy (*Ann. Mus. Congo, Zool.* (1), II, fasc. 4, 1920).

(2) NICHOLS and GRISCOM. Freshwater Fishes of the Congo basin obtained by the American Museum Congo expedition, 1909-1915 (*Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*, XXXVII, 1917, p. 651).

CHARACINIDÆ :	14. *Distichodus fasciolatus* Blgr.
—	15. — *lusosso* Schilthuis.
—	16. *Citharinus gibbosus* Blgr.
CYPRINIDÆ :	17. *Barbus atromaculatus* Nichols et Griscom.
—	18. — *gribinguensis* Pellegrin.
—	19. — *Baudoni* Blgr. var. ***ubanguensis*** var. nov.
—	20. *Barilius Lujæ* Blgr.
—	21. *Chelæthiops elongatus* Blgr.
SILURIDÆ :	22. *Clarias amplexicauda* Blgr.
—	23. *Eutropius Grenfelli* Blgr.
—	24. *Parailia longifilis* Blgr.
—	25. *Gephyroglanis longipinnis* Blgr.
—	26. *Auchenoglanis Ballayi* Sauvage.
—	27. *Synodontis notatus* Vaillant.
—	28. — *decorus* Blgr.
CICHLIDÆ :	29. *Paratilapia cerasogaster* Blgr.
—	30. *Nannochromis dimidiatus* Pellegrin.
—	31. *Tilapia stigmatogenys* Blgr.
OPHIOCEPHALIDÆ :	32. *Ophiocephalus obscurus* Günther.

Labeo uhamensis sp. nov.

La hauteur du corps égale environ la longueur de la tête et est comprise 3 fois 1/2 à 4 fois dans la longueur, sans la caudale. Le museau, arrondi, égal environ à l'espace interorbitaire, est contenu 2 fois 1/2 dans la longueur de la tête. L'œil est latéral et est compris 3 fois 1/2 à 4 fois dans la longueur de la tête, la largeur de la bouche avec les lèvres 3 fois. On ne distingue pas de plis transversaux à la face interne des lèvres. Il existe 2 barbillons de chaque côté, l'antérieur très court, le postérieur faisant de la moitié aux trois quarts du diamètre de l'œil. Les écailles à stries parallèles sont au nombre de 32 à 34 en ligne longitudinale, $\frac{5\,1/2\text{-}6\,1/2}{6\,1/2\text{-}7\,1/2}$ en ligne transversale, 4 ou 4 1/2 entre la ligne latérale et la ventrale, 14 à 16 autour du pédicule caudal. La dorsale débute plus près du bout du museau que de l'origine de la caudale ; elle comprend 3 rayons simples et 10 à 13 branchus ; son bord supérieur est droit, son plus long rayon ne faisant pas tout à fait la longueur de la tête. L'anale formée de 3 rayons simples et de 5 branchus atteint

la caudale ou presque. La pectorale fait les deux tiers environ de la longueur de la tète et n'arrive pas à la ventrale ; celle-ci s'insère au-dessous du milieu de la dorsale et n'atteint pas l'anale. Le pédicule caudal est aussi haut ou un peu plus haut que long. La caudale est fourchue, à lobes pointus.

La coloration est brun-grisâtre sur le dos, jaunâtre sur le ventre avec une tache noire plus ou moins nette à l'extrémité du pédicule caudal.

D. III 10-13 ; A. III 5 ; P. 17 ; V. 9 ;
Sq. 5 $^1/_2$-6 $^1/_2$ | 32-34 | 6 $^1/_2$-7 $^1/_2$.

N° 1920 – 145 à 147. Coll. Mus. — : Sabo (Ouham) : Baudon.
Longueur : 41 + 15 = 56 ; 36 + 10 = 46 ; 35 + 10 = 45 mm.

Ce Labeon décrit sur de jeunes individus semble surtout se rapprocher du *Labeo nigricans* Boulenger (1) de la rivière Sankuru (bassin du Congo) qui possède également 4 barbillons et une dorsale à bord supérieur droit, mais dans cette espèce il existe des plis transversaux au bord interne des lèvres.

Barbus Baudoni Boulenger var. ***ubanguensis*** var. nov.

Le dos est grisâtre, le ventre clair. Une étroite bande longitudinale noire s'étend du bout du museau à l'extrémité de la caudale, séparant le corps en deux parties égales. Une autre ligne noire va de l'occiput à l'origine de la dorsale et se poursuit tout le long de ses rayons antérieurs. Une troisième ligne noire se voit de la fin de l'anale à l'origine de la caudale.

D. III 8 ; A. III 5 ; P. 11 ; V. 8 ; Sq. 3 $^1/_2$ | 24 | 3 $^1/_2$.

N° 1920 — 178. Coll. Mus. — : Bangui (Oubanghi) : Baudon.
Longueur : 21 + 7 = 28 mm.

Ce petit Barbeau sans barbillons et à grandes écailles à stries divergentes se rapporte exactement par ses proportions et par ses formules au *Barbus Baudoni* Boulenger (2), espèce minuscule décrite récemment du Chari, mais sa coloration complètement différente justifie la création d'une variété spéciale.

(1) Cat. Poiss. Congo, Mus. Luxembourg., n° 2, p. 5 (1911).
(2) *Ann. Mag. Nat. Hist.* (9), II. 1918, p. 416.